

双衲夜蛾属 *Dinumma* Walker

Dinumma Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1805.

Type-species: *Dinumma placens* Walker.

Ortheaga Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 927.

喙发达；额扁平；下唇须向上伸，第二节达头顶，第三节直立；触角有纤毛；胸部鳞片平滑，下胸及腿节有长毛，胫节无刺，微有毛；腹部背面有一列毛簇；前翅窄长，顶角及外缘较圆；后翅5脉近4脉，从中室下角伸出。

种 检 索 表

- 体大，翅展 40 mm 左右 曲带双衲夜蛾 *Dinumma deponens*
 体小，翅展 26—34 mm 双衲夜蛾 *D. placens*

曲带双衲夜蛾 *Dinumma deponens* Walker (图版 LIX - 38)

Dinumma deponens Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1806. (印度)

Dichonia bipunctata Motschulsky, 1860, Et. ent. 9: 32.

Amphipyra largeteau Oberthür, 1884, Et. ent. 10: 28.

Dinumma deponens: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 355. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 372. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 164. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin, 3: 366. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 864.

翅展 26 mm。头部黑棕色，触角基节外侧白色，额下部灰色，下唇须灰色，第一、二节外侧杂有黑褐色；胸部黑棕色，足外侧褐灰色，前足胫节与跗节黑灰色，跗节各节间有灰色斑；前翅棕褐色，密布暗褐细点，基线为一黑棕色短条，自前缘脉至亚中褶，在中室处稍间断，内线深波浪形外斜，内侧衬白色，外线大波曲，自前缘脉微外斜，至6脉外突，5脉后内斜，2脉后强内弯，内线与外线之间黑棕色，成一宽带，外线外侧衬白色，外方有一模糊棕色线，曲度与外线相似，外侧衬褐白色，亚端线白色，锯齿形，在7脉处外凸，中段外弯，端区红棕色，5—6脉间有一黑点和一小白斑，近翅外缘有一列白点；后翅褐灰色；腹部褐黑色，基部灰色。

寄主 樱桃、大叶合欢。

分布 山东、河南、江苏、浙江、湖南、福建、江西、广东、广西、云南；日本，朝鲜，印度。

双衲夜蛾 *Dinumma placens* Walker (图版 LIX - 39)

Dinumma placens Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1806. (斯里兰卡)